

AK-LOMMETIPS

Patienter der skal henvises til AK-klinikken (AK):

Alle, som er **ny-ordinerede i AK-behandling** med præparaterne:

- Marevan
- Eliquis – Xarelto – Pradaxa – Lixiana
- Lavmolekylært heparin

Der kan henvises patienter med:

- Opstart af Marevan og Fragmin
- Dysreguleret INR
- Skift fra en AK-type til en anden

Ved henvisning til AK er det vigtigt at:

- Diktere i det ambulante notat eller epikrisen at patienten skal følges i AK
- Sekretæren sender en opgave til AK derom

DOAK (=NOAK) må ikke anvendes til:

Mekaniske hjerteklapper –
mitralstenose (kun moderat og svær) –
svært nedsat nyrefunktion – graviditet og
amning – antifosfolipidsyndrom.



AK-LOMMETIPS

5 punkter du skal overveje forud for ordination af AK-behandling:

1. Indikation
2. Kontraindikation
3. Dosering
4. Interaktion
5. Opfølgning



Husk - stillingtagen til varighed af AK-behandling.

Når der ordineres Marevan:

- Husk at kontakte AK med henblik på opstartssamtale inden udskrivelsen
- AK planlægger tidspunkt og sted for næste INR

Når der ordineres Fragmin/Innohep:

- Der udleveres min. 10 stk. til patienten ved udskrivelsen

Kontakt gerne AK-klinikken tlf. 7844 8263 (kl. 8-15)



Se mere på:

AK-behandling.rm.dk